



gammadyn

GAMMADYN® Zn-Ni-Co
Zinc-Nickel-Cobalt

gammadyn

gammadyn

gammadyn

**Each Ampoule (2 ml) Contains/
Chaque ampoule (2 ml) contient:**

Zinc (zinc gluconate)/
Zinc (gluconate de zinc)67.4 mcg
Nickel (nickel gluconate)/
Nickel (gluconate de nickel) 72.6 mcg
Cobalt (cobalt gluconate)/
Cobalt (gluconate de cobalt) 72.6 mcg

Non-Medicinal Ingredients: Purified water, glucose
Ingrédients non médicinaux : Eau purifiée, glucose

Safety-sealed for your protection and for product freshness. Do not use if ampoule is broken. Store in a cool, dry place.

Emballage scellé pour votre protection et pour garder la fraîcheur du produit. Ne pas utiliser si l'ampoule est endommagée. Conserver dans un endroit frais, à l'abri de l'humidité.

Seroyal
Made in France for
s.a. UNDA n.v.
Dist. by Seroyal Int'l Inc.
Richmond Hill, ON L4C 0L8



gammadyn

GAMMADYN® Zn-Ni-Co
Zinc-Nickel-Cobalt

NPN 80010951



30 Ampoules

Recommended Dose:
Adults (19 years and older): Take one ampoule one to two times daily with meals, a few hours before or after taking other medications, or as recommended by your healthcare practitioner. Squeeze contents directly into mouth. Use for one to two months, or as recommended by your healthcare practitioner.


Oligotherapy Remedy to be used on the advice of your healthcare practitioner.

Risk Information: If symptoms persist or worsen, consult your healthcare practitioner. If you have iodine deficiency; or if you have cancer or a history of tuberculosis, do not use. If you are pregnant or breastfeeding, do not use, unless directed by your healthcare practitioner. If you are taking vitamin B₁₂ supplementation, consult your healthcare practitioner prior to use. If gastrointestinal upset and/or skin rashes occur, discontinue use and consult your healthcare practitioner.

Posologie :
Adultes (19 ans et plus) : Prendre une ampoule une à deux fois par jour aux repas, quelques heures avant ou après avoir pris d'autres médicaments, ou selon l'avis de votre praticien. Presser les contenu directement dans la bouche. Utiliser pendant une à deux mois, ou selon l'avis de votre praticien.

Remède d'oligothérapie à utiliser sur l'avis de votre praticien.

Mention de risque : Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez votre praticien. Ne pas utiliser ce produit si vous avez une carence en iode ; ou si vous avez des antécédents de cancer ou de tuberculose. Ne pas utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez sauf sur l'avis de votre praticien. Si vous prenez un supplément qui contient la vitamine B₁₂, consultez votre praticien avant d'utiliser ce produit. Si des troubles gastro-intestinaux ou une éruption cutanée se manifestent, cessez l'utilisation et consultez votre praticien.



1



2



3

BARCODE LOCATION
883196 31440

Lot

Exp.

Couleurs CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.5405 U

Nom du produit **GAMMADYN Zn-Ni-Co -CAN** Dimensions **70 x 60 x 100**